

# TALLER PRÁCTICO: Dosificación y Administración Régimen AP

Jordi Puig Pla / Cristina Miranda / Patricia Cobarsi

Fundació Lluita contra les Infeccions

Badalona



A black and white photograph of a doctor's hand holding a stethoscope. The doctor is wearing a white lab coat. The background is a blurred hospital hallway with other people walking. The word "Dosificación" is written in bold black text across the lower part of the image.


# Dosificación

# DOSIFICACIÓN

## Recomendaciones para administrar el régimen AP tras omitir una visita de inyección<sup>1,2</sup>

**Dosis omitidas;** Los pacientes que falten a una visita programada de inyección deben ser reevaluados clínicamente para asegurar que la administración de cabotegravir AP y rilpivirina AP continúa siendo apropiada.

¿Cómo retomar el régimen AP si el paciente sigue siendo candidato para recibir el tratamiento?



1. Ficha técnica ▼ VOCABRIA. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022]. 2. Ficha técnica ▼ REKAMBYS. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022].

# Mi paciente necesita recurrir a un puente oral $\leq 1$ mes<sup>1,2</sup>



Mi paciente no puede acudir a su tercera visita de administración, porque se va de viaje del 4 al 27 de mayo. **¿Qué hago?**

Para reemplazar esta visita de administración el paciente recurre a un **puente oral**

**¿Qué día comienza el paciente a tomar el TAR oral?**

- La primera dosis del puente oral se debe tomar en el periodo ventana de la visita de inyección omitida

**¿Cuándo debe el paciente retomar las inyecciones?**

- Se deben **retomar las inyecciones en la fecha más temprana posible**. Si el paciente recurre a un puente oral de 1 mes, **las inyecciones de VOCABRIA + REKAMBYS se administran el último día del puente oral**, manteniéndose la **Fecha Programa de inyección**

**¿Cuánto tiempo ha pasado desde la visita de inyección omitida (menos de 1 mes o más de un mes)? ¿Cuándo debo citar la próxima visita de administración?**

- Como ha pasado  **$\leq 1$  mes** desde la visita de inyección omitida, **continuar con la pauta de dosificación cada 2 meses**

# Mi paciente necesita recurrir a un puente oral >1 mes<sup>1,2</sup>



Mi paciente no puede acudir a su tercera visita de administración, porque se va de viaje del 7 de mayo al 24 de junio. **¿Qué hago?**

Para reemplazar esta visita de administración el paciente recurre a un **puente oral**

**¿Qué día comienza el paciente a tomar el TAR oral?**

- La primera dosis del puente oral se debe tomar en el periodo ventana de la visita de inyección omitida

**¿Cuándo debe el paciente retomar las inyecciones?**

- Se deben **retomar las inyecciones en la fecha más temprana posible**. Si el paciente recurre a un puente oral de más de un mes, **las inyecciones de VOCABRIA + REKAMBYs se administran en el último día del puente oral**, y se **cambia la Fecha Programada de inyección**

**¿Cuánto tiempo ha pasado desde la visita de inyección omitida (menos de 1 mes o más de un mes)? ¿Cuándo debo citar la próxima visita de administración?**

- Para pautas de puente oral que duren **>1 mes**, **REINICIAR** al paciente con las **inyecciones iniciales**, seguido de las segundas inyecciones iniciales un mes después. **Después continuar con la pauta de dosificación cada 2 meses.**

1. Ficha técnica ▼VOCABRIA. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022].  
2. Ficha técnica ▼REKAMBYs. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022].

# ¿Qué pasa si mi paciente no acude dentro de la ventana de dosificación flexible? <sup>1,2</sup>



Mi paciente no acude a su visita de administración en su Fecha Programada ni dentro de la ventana de dosificación flexible.

El paciente acude al hospital el 28 de mayo. ¿Qué hago?

- Los pacientes que falten a una visita programada de inyección deben ser reevaluados clínicamente para asegurar que la administración de cabotegravir AP y rilpivirina AP continúa siendo apropiada.
- Si el paciente continúa siendo candidato para recibir el tratamiento, se debe retomar su calendario de dosificación.

Para retomar su calendario hemos de considerar el tiempo transcurrido desde la visita de inyección omitida ¿ha pasado menos de 1 mes?

- Si, reanudar las inyecciones en la fecha más temprana posible, en este caso se deberían administrar las inyecciones el día 28 de mayo (esta fecha pasaría a ser la nueva Fecha Programada)
- Continuar con la pauta de dosificación cada 2 meses

1. Ficha técnica ▼VOCABRIA. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vocabria-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022].  
2. Ficha técnica ▼REKAMBYS. Disponible en: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information\\_es.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rekambys-epar-product-information_es.pdf) [Último acceso: diciembre 2022].

# ¿Qué pasa si mi paciente no acude dentro de la ventana de dosificación flexible? <sup>1,2</sup>



Mi paciente no acude a su visita de administración en su Fecha Programada ni dentro de la ventana de dosificación flexible.

El paciente acude al hospital el 20 de julio. ¿Qué hago?

- **Los pacientes que falten a una visita programada de inyección deben ser reevaluados clínicamente** para asegurar que la administración de cabotegravir AP y rilpivirina AP continúa siendo apropiada.
- **Si el paciente continúa siendo candidato** para recibir el tratamiento, se debe retomar el calendario de dosificación.

**Para retomar el calendario hemos de considerar el tiempo transcurrido desde la visita de inyección omitida ¿ha pasado más de 1 mes?**

- **Si, REINICIAR** al paciente con las **inyecciones iniciales**, seguido de las segundas inyecciones iniciales un mes después.
- **Después continuar con la pauta de dosificación cada 2 meses.**



# Administración



<https://www.enfermeriaviiva.com/public/1780235edf922yu/materiales-informativos#>



**Gracias!**

**[info@fls-science.com](mailto:info@fls-science.com)**